

ASKAPHY®-27



کود EG

کود مایع NK حاوی عناصر کمیاب

برای تامین مواد غذایی، رشد سالم و فتوسنتز مطلوب

made
in
Germany

کلم، سبزیجات و پیازها: چند مرحله این فرآورده را به میزان ۲-۳ لیتر در هکتار بر حسب نیاز گیاه استفاده کنید.

ASKAPHY-27 فرمولاسیون ویژه ای از کاربامید نیتروژن، پتاسیم فسفیت و عناصر کم مصرف برای کاربرد روی برگ است. با توجه به فرمولاسیون بهینه، بالاترین جذب مواد مغذی برای گیاه تضمین می شود.

دستورالعمل ها:

اختلاف پذیری:

ASKAPHY 27 را می توان با فرآورده های معمول حفظ گیاهان مخلوط کرد. از آنجا که پیش بینی چیزی که در همه ی موارد مصرف رخ می دهد امکان پذیر نمی باشد، توصیه می شود قبل از کاربرد در سطح وسیع، در مقادیر کم به صورت آزمایشی این محصول را بکار ببرید. در طول دوره ی شکوفه دهی از این فرآورده هرگز استفاده نکنید. با توجه به محصول را بکار بگیرید. بیش از مقادیر توصیه شده استفاده نکنید. این فرآورده را بر روی برگ های خشک و حداقل دو ساعت قبل از آبیاری یا بارندگی مصرف کنید.

اندازه ی بسته بندی:

این محصول در بسته های ۱، ۱۰، ۲۰۰ و ۱۰۰۰ لیتری عرضه می گردد. بسته بندی در اندازه های دیگر نیز قابل سفارش می باشد.

شرایط نگهداری و انبارداری:

در ظروف و یا محفظه های در بسته، به دور از نور آفتاب و در دمای بالای صفر درجه ی سانتی گراد نگهداری گردد.

مواد فعال تشکیل دهنده ی محصول و اثر آن:

۳٪ نیتروژن به صورت کاربامید نیتروژن (۴۲ گرم در لیتر)
۱۸٪ K₂O، پتاسیم محلول در آب (۲۵۲ گرم در لیتر)
۲۷٪ O₅P₂، فسفات محلول در آب (۳۷۸ گرم در لیتر)
عناصر کم مصرف مهم مانند ۰/۰۱٪ بر، ۰/۰۲٪ مس، ۰/۰۲٪ آهن، ۰/۰۱٪ منگنز، ۰/۰۰۱٪ مولیبدن، ۰/۰۱٪ روی (به صورت کلات های EDTA یا EDDHA)

پیشنهاد مصرف:

انگور: چند مرحله قبل از شکوفه دهی تا زمانی که میوه به اندازه ی نخود است ۲-۳ لیتر در هکتار این کود را بکار ببرید.

رازک: چند مرحله ASKAPHY-27 را به میزان ۰/۳-۰/۲٪ را بر حسب نیاز گیاه استفاده کنید.

توت فرنگی: دو بار کود دهی با پاشش به وسیله ی دستگاه سمپاش بعد از کاشت به میزان ۱۵-۱۰ لیتر در هکتار (بسته به فاصله ی ردیف های بوته های کاشته شده) در پاییز و ۲-۱ بار محلول پاشی روی برگ در بهار از زمان شکوفه دهی به بعد به میزان ۲-۳ لیتر در هکتار توصیه می گردد.

صیفی جات: چندین مرحله با شروع شکوفه دهی به میزان ۲-۳ لیتر در هکتار از این کود استفاده کنید.

گیاهان زینتی: چند مرحله ASKAPHY-27 را به میزان ۰/۳-۰/۲٪ بر حسب نیاز گیاه استفاده کنید.

گیاهان مدیترانه ای و مرکبات: چند مرحله این فرآورده را به میزان ۰/۳-۰/۲٪ بر حسب نیاز گیاه استفاده کنید.



PHYTO solution AG

... تغذیه گیاهی منظم

PhytoGreen® NPK 12-4-6



made
in
Germany

کود NPK به همراه عناصر ریز مغذی
دارای مواد مغذی طبیعی در مقادیر مناسب برای تمام گیاهان

محصولات گلخانه ای: چند مرحله کاربرد روی برگ و یا درون خاک با
۰/۵ - ۰/۳٪ از این محصول

غلات و حبوبات: برای تامین مواد غذایی از شروع رشد رویشی ۲-۱
مرحله به میزان ۸-۴ لیتر در هکتار از این کود استفاده کنید.
چغندر قند: برای تامین مواد غذایی: ۲-۱ مرحله به میزان ۶-۴ لیتر در
هکتار از آغاز مرحله ی ۶-۵ برگی تا مشاهده ی محصول در میان بوته ها از
این فرآورده استفاده کنید.

در همه ی محصولات: برای کاربرد در خاک: ۰/۵ - ۰/۳٪
دستورالعمل ها:

اختلاط پذیری:

PhytoGreen-NPK-Bio 12-4-6 را می توان با فرآورده های معمول
حفظ گیاهان مخلوط کرد. از آنجا که پیش بینی چیزی که در همه ی موارد
مصرف رخ می دهد امکان پذیر نمی باشد، توصیه می شود قبل از کاربرد در
سطح وسیع، در مقادیر کم به صورت آزمایشی این محصول را بکار ببرید.
PhytoGreen-NPK Bio 12-4-6 را می توان در اندازه قطرات
مختلف اسپری کرد. در موارد پاشش روی برگ توصیه می گردد این عمل در
اوایل صبح، اواخر عصر و یا در روزهای ابری انجام گیرد. همیشه نیاز غذایی
محصول زراعی و همچنین داده های مربوط به تجزیه و تحلیل خاک را
در نظر بگیرید. این فرآورده را بر روی برگ های خشک و حداقل دو ساعت
قبل از آبیاری یا بارندگی مصرف کنید.

شرایط نگهداری و انبارداری:

در ظروف و یا محفظه های در بسته، به دور از نور آفتاب و در دمای بالای
صفر درجه ی سانتی گراد نگهداری گردد.

اندازه ی بسته بندی:

این محصول در بسته های ۰/۲۵، ۱، ۱۰، ۲۰۰ و ۱۰۰۰ لیتری عرضه می
گردد. بسته بندی در اندازه های دیگر نیز قابل سفارش می باشد.

موادفعال تشکیل دهنده ی محصول و اثر آن:

۱۲٪ نیتروژن (۱۲۴/۲ گرم N در لیتر)
۹/۲٪ کاربامید نیتروژن، ۱/۱٪ آمونیوم نیتروژن، ۱/۷٪ نترات نیتروژن
۴٪ فسفر محلول در آب (۴۰/۸ گرم P₂O₅ در لیتر)
۶٪ پتاسیم (۶۲ گرم K₂O در لیتر)
۱٪ روی (۱۰/۵ گرم کلات روی در لیتر)
۱/۱٪ منگنز (۱/۲ گرم کلات منگنز در لیتر)
۱/۱٪ مس (۱/۵ گرم کلات مس در لیتر)
۱/۱٪ بر (۱/۱ گرم B در لیتر)

پیشنهاد مصرف:

میوه های گوشتی: برای کاربرد روی برگ ۱-۰/۵٪ از این محصول را از
آغاز رشد رویشی تا چند مرتبه بکار ببرید. در دوران شکوفه دهی هرگز از
این فرآورده استفاده نکنید.

دانه داران: برای کاربرد روی برگ ۱-۰/۵٪ از این محصول را از آغاز رشد
رویشی تا چند مرتبه بکار ببرید. در دوران شکوفه دهی هرگز از این فرآورده
استفاده نکنید. در ارقام حساس به زنگ در طول دوره های بحرانی توسعه ی
زنگ از این محصول استفاده نکنید.

هسته داران: برای کاربرد روی برگ: ۱-۰/۵٪ در آغاز رشد رویشی تا چند
مرتبه بکار ببرید. در دوران شکوفه دهی هرگز از این فرآورده استفاده نکنید.
گیاهان زینتی، گیاهان مدیترانه ای و مرکبات: چند مرحله کاربرد
روی برگ با ۰/۴ - ۰/۲٪ از این کود

سبزیجات: برای رشد اولیه از شروع مرحله ی دو برگی ۴-۲ مرحله ۰/۴-
۰/۲٪ و برای تامین مواد غذایی ۴-۲ مرحله در طول مدت رشد اصلی
محصول به میزان ۸-۵ لیتر در هکتار از این کود استفاده کنید.



PHYTO solution AG

... تغذیه گیاهی منظم